No. 38.

Observation de Chirurgie Sur une hernie, donnée par Mr. Menjon Maitre en Chirurgie

Le 7. May 1746. Je fus appellé pour une femme agée de 56 ans, qui avoit un vomissement bilieux et dune odeur fort mauvaise. Le pouls estoit fort plein, dur et tendu, Et elle estoit dans une agitation Si grande quelle nepouvoit pas rester un instant dans la meme Situation;

Cette femme medit que depuis vingt et quatre ans elle avoit une tumeur a la partie Superieure dela Cuisse droitte, et quelle avoit toujours porté un bandage;

Jexaminay la maladie et japperceus quela tumeur Setendoit depuis l'epine anterieure et Superieure de los des Iles, jusqua une des grandes levres dela vulve, Elle estoit tendue, dure, inegalle, et tres douloureuse, ce qui me fit connoitre que cestoit une hernie formée par

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 15 d.31

la presence de l'jntestin et de l'epiploon et que
les accidents qui l'accompagnoit estoit vne Suitte
de l'etranglement, Et apres auoir examiné le
bandage, je m'apperceus quil estoit plus pernicieux
qu'utile par l'jrregularité de Sa construction,
La Malade me dit quelle auoit fait en vain
H
S'ety a long temps plusieurs tentatiues pour reduire les parties, parce
que dautres fois elles luy auoit reussy, Cette
circonstance me fit esperer que celles que je ferois,
pourroit faire disparoitre la tumeur, mais elles
neurent pas plus de Succez que celles de la malade,
Je Seignay cette femme Sur le champ, et
j'appliquay Sur la hernie vn cataplasme anodin
en attendant quon en preparat demolians, dont
l'application fut renouvellée de Six heures en six
heures, et quatre Seignées furent faites dans
la Journée, Cela ne fit que calmer vn peu les
accidents pendant la nuit, Le lendemain la
tumeur me parut vn peu plus mollette, je me
flattois quen faisant de nouvelles tentatiues je
procurerois la reduction des parties, mais elles
furent aussy jnutiles que le jour precedent,

Jajoutay aux Cataplasmes emoliens des resolutifs, je reïteray la Saignée et je prescrivis deux lavements emoliens dans la Journée qui ne procurerent aucune evacuation, Les accidents augmenterent considêrablement dans la nuit, car je trouvay le lendemain la fievre et la douleur beaucoup plus violente, et le vomissement bilieux et des Bouillons, accompagné de celuy des matiers fecales. Alors voyant quil ny avoit dautre ressource que loperation je lannonçay aux parens et à la malade, Apres lavoir persuadée et fait un prognostique douteux du Succez ~~de loperation~~ je la fis administrer, Et je fis appeller Messieurs Delpech et Reselauze mes Confrers, Nous trouvames la malade dans ce meme moment un peu mieux parce quelle venoit d'aller a la garderobe, Cette circonstance nous fit differer loperation, et je continuay les memes remedes dans lesperance quils pourroient procurer quelque relachement pour reduire les parties. Mais elle ne fut pas de longue durée, puisque les accidents redoublerent ~~recommencerent~~ Sur les quatre heures du Soir avec la meme violence. Ces Messieurs ayant esté mandez de nouveau

fit esperer les parens

et tout estant disposé pour loperation, je voulus pincer
lapeau suivant la methode ordinaire, mais il ne
me fut pas possible à cause dela tension extraordinaire
dela tumeur, je louvris en dedolant avec le bistoury
et au moyen dune sonde cannelée que je glissay dans
le tissu cellulaire, jallongeay lincision haut et bas
selon letendue dela tumeur, Et apres avoir coupé
les feuillets membraneux et ouvert le sac herniaire,
nous trouvames ainsy que je lavois reconnu que la
hernie estoit formée par la presence de lintestin et
dune grande portion de lepiploon, lun et lautre
fort alterez, ainsy que leur couleur livide et la
mauvaise odeur qui en exhaloit le demontroit;
Les adherences que ces parties avoit contracté
ensemble ayant esté detruits, je debriday
lanneau pour remedier à letranglement, nous
apperçumes alors dautres adherences entre lintestin
et lepiploon a la circonference de lanneau que
je respectay, afin que lintestin estant reduit
dans le ventre demeurat toujours assujetty à
lanneau;
La reduction de lintestin faitte, je fis la ligature

de lepiploon et je le coupay a deux travers de doigt de distance, je mis une plotte ~~dans~~ Sur lanneau et le reste du pansement fut fait à la methode ordinaire,

Le Soir la malade Se trouvant fort agitée je luy fis une Seignée Et elle Sentit pendant la nuit de legers douleurs de colique et fut à la garderobe;

Le lendemain la malade estoit tres foible et comme les douleurs de colique Subsistoit nous continumes quon luy donneroit un lavement anodin et emolient, ce qui calma les douleurs et procura une evacuation abondante ce qui produisit un peu de Soulagement,

Le Soir a la levée de lappareil il exhaloit de la playe une odeur fetide, jl fut convenu que pour combattre la pourriture, jarroseray la playe avec lesprit de therebentine et que les pansements Seroit faits avec un digestif animé deau de Vie camphrée et le Sel ammoniacq; Nonobstant ces precautions les Exhalaisons devenoit tres insuportables, ce qui nous fit Substituer au digestif longuent de Styrax animé des Ingrediens

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Susdits, afin d'accelerer la Chutte des Scarres;
Cette nouvelle methode procura une Suppuration
abondante, et la malade alloit regulierement
a la garde robe, Mais le Sixeme jour de
l'operation deux heures apres le pansement,
l'intestin s'ouvrit et tout l'appareil fut
inondé de matiers fecals, je pansay la playe
tout Simplement, et je Scituay la malade
de maniere que la tete estoit plus elevée que la
poitrine, et celle cy plus que le ventre afin de
ne pas violenter par une Scituation contraire,
les ~~adherences~~ adhesion que l'intestin avoit contracté aux
environs de l'anneau, et par ce moyen facilitai
la Sortie des matiers fecals, et empecher
l'epanchement dans le ventre
Mr. Lerie notre confrere fut appellé dans ce
temps la, et nous aida par la Suite de Ses conseils;
La quantité de matiers fecals, Sereuses et
bilieuses qui Sortoient par la playe, m'obligea
de panser la malade trois fois par Jour

a luy faire prendre du diascordium et quelques potions purgatives composées de Manne et de Catholicum double, Cette pratique jointe a un regime Severe calma levacuation considerable que je regardois comme un devoyement, et la fievre cessa.

Mais la malade S'estant ecartée peu de temps apres du Regime que je luy avois prescrit, la fievre et le devoyement Survinrent, la playe devint Blasphardes, et la Suppuration diminua considerablement, Ces Simptoms qui annonçoient un reflux de matiers de purulentes, et la grande maigreur dans laquelle la malade estoit tombée, me firent craindre pour sa vie; Neanmoins par les bons Soins que nous eûmes de la malade, la Suppuration Se retablit, la playe reprit Sa couleur naturelle, et peu à peu, les autres Simptoms Se dissiperent

Un Eresipelle phlegmoneux qui estoit Survenu aux Environs de la playe et qui interessoit la

grande lèvre de la vulve, se termina par un
depot a cette partie, que jouvris en presence des
Consultants, une branche dartere de la honteuse
externe qui se trouva dans le trajet de lincision
fut ouverte et quoy quelle fournit beaucoup de
sang, il fut facilement arresté par la compression,
Il y avoit alors cinq semaines que loperation estoit
faitte

Depuis ce temps lecoulement des matiers fecals
et la suppuration furent moins abondants, les
chairs se regenererent sy bien que la cicatrice se
forma peu apeu, jusquau point quil ne sortit plus
par la playe que quelques vents Le 28. Juin qui
estoit le 43.e Jour apres loperation, la malade
commença a faire une selle par la voye ordinaire
et la playe fut entierement consolidée le 28.
Juillet environ deux mois et demy apres
loperation, Je pris le party de faire faire un
Bandage a la malade afin de prevenir une
nouvelle hernie Et elle jouit a present dune
parfaitte santé;

Menjon